



... y tú, ¿Cómo quieres que sea tu vejez?

CONDICIONES Y PROTOCOLO PACIENTE TAU-KIT®

El test de aliento se debe realizar después de, al menos, 1 mes sin terapia antibacteriana sistémica (aminoglucósidos, ansamicinas, carbacefem, carbapenem, cefalosporinas, glicopéptidos, macrólidos, monobactámicos, penicilinas, polipéptidos, quinolonas, sulfonamidas tetraciclinas y otros antibióticos) y 14 días después de la última dosis de agentes antisecretores ácidos como inhibidores de la bomba de protones, sales de bismuto, hidróxido de aluminio o magnesio y sucralfato, ya que pueden interferir con el status de la *H. pylori*. Muy importante después de una terapia de erradicación de *H. pylori*.

- Las pruebas de aliento no se deben realizar en pacientes que hayan tenido una terapia de antibióticos, lavado intestinal o enteroscopia, a menos que hayan pasado 4 semanas después de estos tratamientos o exámenes.
- El paciente tiene que estar en **ayunas** desde la noche anterior, por lo menos 8 horas antes de la realización de la prueba.
- Durante la realización del test de aliento, el sujeto no puede comer nada en absoluto, ni masticar chicle porque, usualmente, los chicles contienen sorbitol, el cual puede ser fermentado para formar CO₂, H₂ y CH₄ en el intestino.
- Los individuos que quieran hacerse la prueba tienen que abstenerse de fumar y de realizar cualquier esfuerzo físico, al menos 30 minutos antes de la ingestión del sustrato y durante el tiempo que dure la prueba.





